Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar.
XLV. 1902—1903. N:o 6.

Capsidae

ex

Abessinia et regionibus confinibus

enumeratae novaeque species descriptae

ab

O. M. Reuter.

Cum tabula.

---

1. Rhinofulvius Reut.

Corpus oblongo-ovatum; glabrum, capite porrecto, horizontali, pronoto distincte longiore, ante oculos longe rostrato-producto, fronte versus apicem leviter declivi, clypeo fortiter prominente, basi subhorizontali cum fronte confluente, a latere viso apicem versus fortius dilatato, vertice linea media longitudinali impressa, angulo faciali sat leviter acuto, genis sat humilibus; oculis magnis, exsertis, granulatis, a latere visis haud usque ad gulam extensis, ab antico visis orbita interiore rectis, versus apicem leviter divergentibus: rostro coxas posticas modice superante, articulo primo medium oculorum vix attingente, antennis paullo supra apicem oculorum interne insertis, a margine oculi longe remotis, articulo primo apicem capitis vix superante, secundo versus apicem sensim sat incrassato ibique tamen primo sat multo graciliore, ultimis gracilibus; pronoto horizontali (formæ brachypterae) strictura apicali obsoleta, callis maximis convexis, fere usque ad basin extensis, lateribus basin versus sinuatis, disco medio sulco callos separante instructo, margine basali leviter sinuato, angulis basalibus retrorsum sub-productis, margine laterali usque ad stricturam acute carinato; scutello basi latissime detecto: hemielytris formae brachypterae cuneo membranaque nullis,

apice versus suturam oblique truncatis, coxis anticis longis apicem mesosterni superantibus. A *Fulvio* Stål oculis haud usque ad gulam extensis; capite ante oculos adhuc longius producto, antennis longius ante marginem oculorum insertis etc. divergens.

Rhinofulvius albifrons (Reut.) Reut.

Tab. I, fig. 1.

Niger vel fusconiger, opacus, capite, articulo primo antennarum, maculis qvatuor magnis hemielytrorum, prosterno, macula laterali metastethii, coxis omnibus, femoribus, disco ventris margineque connexivi niveis, antennis tibiisque sordide griseo-albidis, illis apicem versus griseis, his annulo basali apiceque cum tarsis albis; capite superne basi nigro, utrinque lineis duabus obliquis albis, inferne et lateribus, apice excepto, nigrofusco-conspurcato; oculis nigris. Long. ♀ 4 mm.

Fulvius albifrons Reut., Ent. Tidskr. 1895, 151, 14! *Rhinofulvius* id. Reut., Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIV, 1902, p. 156, 38!

Arabia meridionalis (Aden!), D. Simon (coll. Reuter).

Caput ab antico visum latitudine cum oculis fere $^2/_5$ longius, a latere visum altitudine basali fere $^2/_3$ longius, vertice oculo fere duplo latiore (♀). Rostrum grisescens. Antennae articulo secundo primo fere triplo longiore, duobus ultimis simul sumtis secundo parum longioribus. Pronotum formae brachypterae latitudine basali paullo breviore, apice qvam basi circiter $^2/_5$ angustiore. Hemielytra (♀) apicem segmenti tertii *) abdominis vix superantia, sutura clavi sat obsoleta, macula humerali subtriangulari, macula anguli apicalis minore, subquadrata.

2. Pantiliodes pallidus (Ramb.) Reut.

Phytocoris pallidus Ramb., Faun. Andal. 159, 1. *Pantiliodes* id. Reut., Hem. Gymn. Eur. V, 238, 1, T. II, fig. 14!

*) Nec secundi, ut in Ent. Tidskr. l. c.

Phytocoris punctum Reut., Ann. Soc. Ent. France Ser. V, VII, 30, 25! *Pantiliodes* id. Noualh., ibid. LXII, 15, 92.

Djibouti!, D. H. Coutière (Mus. Paris.); etiam in Arabia meridionali (Aden!, m. dec. 1898), D. O. Simony (Mus. reg. Vindob.). — (Subregio mediterranea regionis Palaearcticae).

3. Pantiliodes elongatus (Leth.) m.

Elongatus, albido-testaceus vel pallidior stramineus, sat nitidus, brevissime et tenuissime flavicanti-pubescens; antennis apicem versus ochraceo-fulvis; pronoto atomis fuscis destituto, sed interdum fascia basali tenuissima infuscata; scutello basi maculis duabus fusco-ferrugineis, vitta tenui media ante apicem abbreviata ferruginea, extremo apice fusco-ferrugineo; hemielytris innotatis, commissura clavi et corii tenuissime sanguinea, membrana cum venis pallida, vena brachiali sanguinea; femoribus posticis apicem versus atomis sanguineis conspersis, tibiis totis pallidis, pallido-spinulosis. Long. ♂ ♀ 7 mm.

Megacoelum elongatum Leth., Ann. Mus. Civ. Nat. Gen. XVIII, 1883, p. 293, 41!

Scioa, Sciotalik! d. 23 decembris 1878, D. Antinori (Mus. civ. Genov.).

P. pallido Ramb. simillimus, vix nisi corpore superne paullo magis nitido, atomis nigris sparsis destituto, scutelli apice fusco-ferrugineo nec nigro, commissura clavi tenuiter sanguinea divergens. Caput basi pronoti fere duplo angustius, ab antico visum latitudini cum oculis aeque longum, a latere visum altitudini basali longitudine aqvale, vertice oculo circiter $1/3$ angustiore (♂) vel huic aeque lato (♀), fronte utrinque strigis obliqvis ferrugineis signata. Antennae articulo primo pronoto, strictura apicali excepto, aeque longo, pallide flavente, interne atomis nonnullis minutissimis ferrugineis signato, setis 2—3 rigidis instructo, secundo primo fere duplo et dimidio longiore, pallide flavente, apicem versus ochraceo-fulvo, ultimis ochraceo-fulvis, tertio secundo circiter $1/7$ breviore. Pronotum latitudine basali $2/5$—$1/3$ brevius, basi apice duplo latiore, disco versus apicem sat fortiter declivi,

parum convexo, transversim rugoso. Hemielytra laevia, atomis fuscis destituta, sed commissura sanguinea. Tarsi toti cum ungiculis pallidis.

4. Megacoelum persimile n. sp.

Sordide albido-testaceum, capite lineis duabus longitudinalibus percurrentibus basi et apice convergentibus lineaque utrinque interne ad insertionem antennarum sanguineis; antennis pallide flaventibus, articulis duobus basalibus atomis sparsis sanguineis, primo adhuc lineis duabus exterioribus longitudinalibus, secundo basi et medio marginibus antico et postico tenuiter fusco-sanguineis, apice fuscescente, ultimis fuscis, basi albidis, tertio secundo circiter $^1/_8$ breviore; pronoto limbo basali infuscato; scutello nigro-fusco, linea media longitudinali obsoleta pallidiore; hemielytris clavo interne usque ad venam apiceque sat late, corio macula parva interiore basali, macula magna communi commissurae, cuneo angulo interiore apiceque nigro-fuscis, membrana pallide infuscata, venis fuscis. Long. ♂ 7 mm.

Massaua!. D. Frasca (Mus. civ. Gen.).

M. pellucenti Put. simillimum, vix nisi statura sat multo minore, scutello toto fusco (character variabilis?), cuneo apice sat late fusco divergens: forsitan solum varietas ejus. Caput basi pronoti fere duplo angustius, gula omnium brevissima; vertice maris oculo fere $^1/_3$ angustiore, sulco optime distincto. Antennae articulo primo pronoto strictura apicali excepta aeqvilongo, secundo primo circiter duplo longiore et latitudine postica pronoti saltem $^1/_3$ longiore. Pronoto basi quam apice magis qvam duplo latius, sordide testaceum, basi anguste infuscatum, margine tamen basali pallido, strictura apicali tenuissima, margine ejus postico lineaque utrinque marginali antica tenuissime fuscis, disco postico dense subtiliter coriaceo. Scutellum subtiliter coriaceum. Hemielytra abdomen sat longe superantia, macula commissurae antice usque ad medium commissurae clavi producta ibique late levissime oblique sinuata, lateribus postice nonnihil ampliata, apice

in angulum interiorem cunei oblique continuata. Venter utrinque striolis sanguineis in seriem dispositis. Pedes exempli desunt.

5 Eurycyrtus parvulus n. sp.

Tab. I, fig. 2.

Inferne pallide flavens, superne fusco-ferrugineus, opacus, capite, strictura apicali margineque basali pronoti nec non scutello apicem versus pallide flaventibus; margine basali extremoque apice scutelli nigro-fuscis; pronoto vitta media magis minusve distincta pallidiore; scutello vitta media vel etiam lateribus ferrugineis; hemielytris flavo-ferrugineis, breviter nigro-pubescentibus, angulo apicali exteriore corii apiceque cunei fuscis, membrana hyalina, venis fuscis; antennis testaceis, articulo secundo apice infuscato, primo et secundo crassis, hoc maris cylindrico primo fere paullo magis qvam triplo longiore, duobus ultimis gracilibus, longitudine aeqvalibus, simul sumtis secundo fere duplo brevioribus; pedibus pallide flaventibus; rostro apicem coxarum posticarum attingente, articulo primo caput paullo superante; metastethio orificiis distinctis, transversis, marginatis. Long. ♂ 2 $^{3}/_{4}$ mm.

Djibouti! a. 1897, D. H. Coutière (Mus. Paris.).

Ab *E. Bellevoyei* Reut. statura minore, structura antennarum, pronoto versus apicem minus declivi, orificiis metastethii distinctis, transversis, marginatis mox distingvendus. Caput verticale, basi pronoti circiter $^{2}/_{5}$ angustius, ab antico visum latitudine frontis oculique unici parum longius, a latere visum altitudine circiter duplo brevius, vertice (♂) oculo magno aeque lato, fronte convexiuscula perpendiculari, clypeo sat prominente, basi a fronte optime discreto, angulo faciali subrecto, genis humilibus, gula brevi, obliqua. Ocul (♂) magni, exserti, orbita interiore late sinuati, apicem versus vix divergentes. Antennae supra apicem oculorum interne insertae, maris articulo primo cylindrico solum basi constricto, secundo primo aeque crasso, margini basali pronoti aeque longo. Pronotum basi longitudine vix duplo et apice magis qvam duplo latiore, lateribus rectis, strictura

apicali articulo primo antennarum saltem aeque crasso, callis haud elevatis, nonnihil obliquis, marginibus praecipue postico impressis, disco sublaevi. Coxae anticae medium mesosterni paullo superantes. Tarsi articulo primo secundo fere aeque longo, tertio duobus ultimis simul sumtis longitudine aeqvali.

6. Stenotus binotatus (Fabr.) Reut.

Lygaeus binotatus Fabr., Ent. Syst. 172, 130. *Oncognathus* id. Fieb., Eur. Hem. 246, 1. *Stenotus* id. Reut., Hem. Gymn. Eur. 123, 1, Tab. V, fig. 5 (♂)! *Stenotus sareptanus* Jak., Bull. Nat. Mosc. LII (2), p. 289 (♂)!

Scioa!, m. junii et julii 1880, D. Antinori (Mus. civ. Genov.).

7. Lygus fatuus Leth.

Pallide ochraceus, superne longe flavo-pubescens, hemielytris adhuc pilis brevioribus et minus tenuibus argenteis in maculas collocatis; fronte macula biramosa vel annuliformi, pronoto macula apicali transversa per callos ducta, antice utrinque guttula pallida notata, scutello macula utrinque laterali partis apicalis, nec non cuneo apice nigro-piceis, clavo angulo scutellari, corio fasciis duabus, altera ante medium, altera apicali, cuneo angulo interiore vittulaque basali marginis exterioris fuscis; membrana hyalana, venis fuscis, vena connectente areae majoris albida, areolis apice fuscis, venis externe fusco-cinctis, limbo exteriore membranae laterali fusco, stria inter apicem cunei et apicem areolae minoris maculaque majore rectangulari ante medium hyalinis, limbo apicali minus late arcuque discoidali huic parallelo mox infra tertium apicalem partem posito externe cum vitta longitudinali infra apicem areolae majoris ducta conjuncto, fuscis; capite transverso, sub-verticali, a latere viso altitudine basali fere duplo breviore, gula brevi, obliqva, vertice feminae oculo maximo fere duplo angustiore, margine aeqvaliter sat crasse carinato; pronoto confertim sat subtiliter subruguloso-punctato, scu-

tello crebre transversim ruguloso-strigoso, hemielytris subtiliter punctulatis; antennis ochraceis, articulo secundo margine basali corii circiter $1/3$ breviore, ima basi dimidioque apicali nec non articulis ultimis nigro-fuscis, his basi anguste albidis; femoribus basi annulisque apicalibus femorum anteriorum duobus, posticorum tribus, tibiis annulo basali et medio nec non apice, tarsis apice articuli ultimi nigro-fuscis. Long. ♀ $6^{3}/_{4}$ mm.

Lygus fatuus Leth., Ann. Mus. Civ. Nat. Gen. XVIII, 1883, p. 749, 36!

Scioa, Giagaguè!, m. aprilis—junii, D. Antinori (Mus. civ. Genov.).

Species pubescentia hemielytrorum argentea in maculas collocata, colore tibiarum et praecipue vertice etiam feminae valde angusto insignis. Corpus feminae sat late ovale. Caput basi pronoti $3/5$ angustiore, fronte valde declivi, clypeo perpendiculari a fronte impressione leviter discreto, genis humillimis. Oculi fusci, maximi, orbita interiore infra medium profunde sinuata. Antennae in sinu oculorum insertae, articulo secundo primo fere duplo et dimidio longiore, tertio primo vix longiore et latitudine capitis (cum oculis) saltem $1/3$ breviore, qvarto tertio $2/5$ breviore. Pronotum latitudine basali circiter $2/5$ brevius, basi qvam apice fere triplo latius, disco postico sat fortiter convexo. Scutellum apice albido. Hemielytra apicem abdominis sat longe superantia. Tibiae testaceo-spinulosae. Tarsi articulo secundo margine inferiore eodem primi parum longiore, tertio secundo aeqve longo.

8. Lygus abessinicus n. sp.

Oblongus, pallide ochraceus, pronoto callis maculaque laterali utrinque mox ante angulos posticos, scutello vittis duabus latis parallelis, clavo margine scutellari apiceque, corio macula interiore prope tertiam apicalem partem suturae clavi maculisque apicalibus, cuneo apice, pectore maculis lateralibus, femoribus posticis annulo lato ante medium duobusque ante-apicalibus, tibiis omnibus extrema basi, posticis etiam

annulo subbasali, anterioribus apice tarsisque articulo ultimo nigro-piceis; membrana hyalina, venis fuscis, areolis totis, macula ad apicem cunei apicem areolae minoris attingente aliaque limbi exterioris majore usque ad angulum areolae majoris producta nec non macula discoidali fusco-fumatis; pronoto confertim fortiter impresso-punctato, scutello hemielytrisque crebre attamen paullo minus dense impresso-punctatis, illo adhuc crebre fortiter transversim strigoso; vertice (♀) oculo vix aeque lato, omnium tenuissime marginato, medio fere immarginato. Long. ♀ 6 mm.

Kupi, D. Dmitrijeff (Mus. Acad. Petrop.).

Praecedenti colore signaturisque sat similis, statura multo magis oblonga, vertice omnium tenuissime marginato, scutello non solum strigoso, sed etiam crebre punctato, hemielytris fortius punctatis structuraque tarsorum mox distinguendus. Caput cum oculis basi pronoti duplo angustius, vertice medio sulco longitudinali instructo, fronte valde declivi, clypeo basi a fronte leviter discreto, genis humilibus. Oculi (♀) magni, nigri, nitidi, laeviusculi, orbita interiore fortiter sinuati. Antennae speciminis descripti desunt. Pronotum basi longitudine circiter dimidio latiore et apice fere triplo latiore, disco postico versus apicem sat fortiter convexo-declivi. Tibiae subtiliter testaceo-spinulosae. Tarsi postici articulo secundo margine inferiore eodem primi duplo longiore, tertio secundo breviore.

9. Lygus vittatus n. sp.

Superne pallide flavo-testaceus vel fere albido-flavens, capite ochraceo; pronoto apice cum callis fasciaque sat lata ante limbum basalem, scutello vitta media interdum obsoleta, clavo margine scutellari apicem versus late, commissura suturaque clavi anguste, corio vittis duabus posterioribus per venas ductis angulisque apicalibus nigris; membrana obscure fumata, medio pallidiore, venis testaceis; cuneo gutta media marginis basalis dimidioque apicali femorum posticorum sangvineis, his ante apicem annulis duobus nigricantibus; tibiis fortiter nigro-spinulosis, anticis parce spinulosis; tarsis nigro-

fuscis, articulo secundo pallide flavente; capite verticali, basi pronoti parum magis quam $^1/_3$ angustiore, fortiter transverso, a latere viso brevissimo, vertice omnium tenuissime obsoletissimeque marginato vel immarginato, clypeo basi cum fronte subconfluente: rostro apicem coxarum posticarum attingente; antennis gracilibus, articulo secundo margini basali pronoti aequelongo, apice nigro; pronoto crebre subtiliter punctato, hemielytris adhuc densius et subtilius punctulato. Long. ♀ $3^1/_2$ mm.

Djibouti!, D. H. Coutière a. 1897 (Mus. Paris.).

Species a reliquis vertice immarginato vel omnium obsoletissime marginato signaturisque mox distincta. Caput verticale, ab antico visum latitudine verticis oculique unici fere brevius, a latere visum altitudine paullo magis quam duplo brevius, vertice (♀) oculo aequelato, immarginato vel omnium tenuissime et obsoletissime marginato, margine tenui, acuto, fronte et clypeo perpendicularibus, hoc parum prominente, basi cum fronte sub-confluente, genis humilibus, gula brevi. Oculi magni, fusci. orbita interiore supra medium paralleli, dein fortiter sinuati, postice angulis pronoti anticis sub-incumbentibus. Rostrum pallide testaceum, apice nigro. Antennae pallide testaceae, graciles, articulo primo apicem versus sensim sat incrassato, apice nigro, ultimis fuscescentibus, simul sumtis secundo circiter $^1/_6$ brevioribus, tertio latitudini basali capitis longitudine subaeqvali, qvarto tertio circiter duplo breviore. Pronotum basi longitudine duplo latius, apice longitudine distincte latiore, disco apicem versus leviter declivi, strictura apicali tenui, angulis anticis ab oculis obtectis, margine basali latissime rotundato. Scutellum basi obtecta, parte apicali subtiliter transversim strigosa. Hemielytra (♀) abdomen modice superantia. Metastethium orificiis bene distinctis. Tarsi postici articulo primo secundo fere duplo breviore, tertio secundo longitudine subaequali.

10. Lygus perversus n. sp.

Pallide flavo-testaceus, superne tenuissime pallido-pubescens, nitidus, hemielytris nitidulis; capite margine elevato verticis, vitta media usque in apicem clypei ducta vittaque utrinque laterali ad oculum nigro-piceis, his vittis marginem verticis haud attingentibus; pronoto apice medio vittis duabus obliquis curvatis callos antice et interne terminantibus vittisque qvatuor pone callos nigro-piceis, vittis intermediis postice dilatatis et medio distantibus sed cum vitta utraque laterali confluentibus, vittis lateralibus margini parallelis, externe medio sinuatis, limbis omnibus pallide flavo-testaceis; scutello vittis duabus parallelis appropinquatis nigro-piceis; hemielytris margine scutellari commissuraque clavi, margine exteriore corii et cunei, venis omnibus margineque interiore embolii tenuiter nigro-piceis, membrana nigro-fusca, venis sordide pallidis; antennis nigro-fuscis, articulo secundo testaceo, basi angustius, apice saltem $^1/_3$ nigro-fuscis; pedibus flavo-testaceis, femoribus posterioribus apice annulis parum distinctis fuscescentibus, tibiis tenuiter et breviter fusco-spinulosis, ipsa basi distincte fusca, apice leviter fuscescente, tarsis articulo ultimo fusco; capite latitudine cum oculis paullulum breviore, vertice (♂) oculo $^1/_3$—$^1/_4$ latiore; antennis articulo secundo margini basali pronoti longitudine subaequali, tertio latitudine capitis circiter $^1/_5$ breviore. Long. ♂ 5 mm.

Scioa, Let. Marefia!, D. Ragazzi, m. augusti 1887 (Mus. civ. Gen.).

Species colore signaturisque, pronoto nigro-fusco-signato, callis tamen pallidis etc. distinctissima. Caput basi pronoti circiter $^3/_7$ angustius, verticis margine tenuiter aeqvaliter carinato, clypeo a fronte impressione distincta discreto, angulo faciali recto, genis (♂) sat humilibus, gula brevi obliqua. Oculi fusci, sub-laeves. Antennae articulo secundo primo circiter duplo et dimidio longiore, duobus ultimis simul sumtis secundo paullulum brevioribus, quarto tertio circiter $^1/_3$ breviore. Pronotum latitudine basali paullo minus quam duplo brevius, strictura apicali (♂) articulo secundo antennarum fere aeque crasso, apice basi duplo angustiore, disco dense

sat subtiliter punctato; piceo-nigrum, strictura apicali marginibusque omnibus, callis, vitta media basi et apice tenuiore, nec non vitta utrinque laterali obliqua postice abbreviata flavo-testaceis. Scutellum transversim subtiliter strigosum. Hemielytra sublaevia, abdomen (♂) sat longe superantia, membrana iridescente. Tibiae spinulis crassitie tibiarum brevioribus. Tarsi articulo secundo margine inferiroe eodem primi paullo sed distincte longiore, tertio secundo aeque longo.

11. Lygus Simonyi n. sp.

Oblongus, flavo-testaceus, hemielytris pube nitida subargentea vel pallide aurea vestitis; capite transverso, vertice tenuiter sat obsolete marginato, oculo circiter $^1/_3$ angustiore (♂) vel huic aequelato (♀), fronte maris sulco medio longitudinali instructo; oculis nigris, maris magnis; rostro apicem coxarum attingente; antennis articulo secundo apice nigro, ultimis fuscis, tertio saltem dimidio basali testaceo, etiam qvarto ipsa basi pallido, secundo latitudine basali capitis circiter dimidio longiore et margini basali pronoti aeque longo (♂) vel hoc paullo breviore (♀), duobus ultimis simul sumtis secundo paullulum brevioribus, tertio secundo circiter $^3/_7$ breviore; pronoto dense subtiliter punctato; hemielytris obsoletissime dense punctulatis, margine exteriore corii concolore, corio fascia apicali interdum deficiente cuneoque angulo interiore fuscis, hoc apice piceo-nigro; membrana nigricante, areolis, macula transversa limbi exterioris ante medium arcuque discoidali venis parallela hyalinis, areolis duabus apice nigricantibus, venis pallide testaceis, brachiali medio late nigricante; pectore nigro-fusco, orificiis marginibusque acetabulorum pallide flaventibus; pedibus cum coxis pallide flaventibus, femoribus intermediis annulis angustis ante-apicalibus fuscescentibus, posticis plus quam dimidio apicali infuscatis, apice annulisque duobus magis minusve obsoletis anteapicalibus pallidis; tibiis omnibus spinulis sat validis fuscis armatis, posticis basi interne fuscescentibus, tarsis articulo ultimo extremo apice fusco. Long. 4 mm.

Arabia meridionalis (Aden!, m. decembris 1898), D. O. Simony (Mus. Vindob.).

Lygo cervino H. Sch. primo intuitu sat similis, margine corii laterali concolore, structura antennarum, spinulis tibiarum fuscis validioribus divergens, a *L. divergente* Reut., cui valde affinis, oculis maris paullulum majoribus, vertice inter illos paullo angustiore, colore femorum distinguendus. Caput verticale, ab antico visum latitudine verticis oculique unici parum longius, a latere visum altitudine duplo brevius, gula haud distinguenda, clypeo leviter prominente, basi a fronte leviter sed distincte discreto, angulo faciali recto. Rostrum apice nigro. Antennae articulo primo apicem capitis paullo superante, secundo fere quarta apicali parte nigro, tertio latitudini posticae verticis et oculorum longitudine subaequali. Pronotum basi longitudine paullo minus quam duplo latiore, apice longitudini aeque lato, disco sat aequaliter levius convexo, callis obsoletis concoloribus. Hemielytra abdomen sat longe superantia. Venter pallido-pubescens, maris vitta utrinque picea, feminae adhuc medio lateribusque basin versus piceis.

12. Camptobrochis Martini (Put.) Reut.

Capsus Martini Put., Rev. d'Ent. VI, 306, 11! *Camptobrochis* id. Reut., Hem. Gymn. Eur. V, 39, 2! *Camptobrochis pallidus* Reut., Rev. d'Ent. IX, 255, 2!

Djibouti!, D. Coutière (Mus. Paris.). — (Algeria, Aegyptus; insula Cyprus, D. Goudry).

13. Camptobrochis tibialis n. sp.

Niger, nitidus, glaber, capite scutelloque laevibus, pronoto hemielytrisque punctatis; vertice margine postico, pronoto ipso margine basali, scutello apice vel toto, orificiis metastethii, tibiis annulo in tertia basali parte posito alioque latissimo infra medium, tibiarum posticarum apicem subattingente, albidis; antennis articulo secundo margine basali pro-

noti circiter $^1/_4$ breviore: pronoto strictura apicali nitida, callis confluentibus, margine basali medio sinuato lateribus rotundato, disco fortiter punctato; clavo basique corii fortius, corio apicem versus cuneoque obsoletius et subtilius punctatis: membrana fusca, venis nigris. Long. ♀ $4^1/_2$—$4^2/_3$ mm.

Eritrea, Cheren!, D. F. Derdii (Mus. civ. Gen.).

Primo intuitu *C. scutellari* Reut. e Java similis, differt statura paullo majore, colore capitis, rostri, antennarum et pedum, hemielytris unicoloribus, strictura apicali pronoti nitida etc. Caput basi pronoti fere duplo angustius, ab antico visum latitudine frontis oculique unici paullo longius, vertice oculo $^2/_3$ — duplo latius. Oculi fusci. Antennae nigrae, articulo primo apicem capitis haud superante, secundo griseo-pilosulo. Pronotum latitudine basali circiter $^1/_3$ brevius, basi qvam apice fere triplo latiore. Hemielytra feminae abdomen breviter superantia; membrana areola majore versus apicem interne latissime arcuata, ne minime quidem angulata. Tibiae tenuiter spinulosae, spinis fusco-testaceis. Tarsi postici articulo primo secundo aeque longo.

14. Glossopeltis n. gen.

Corpus sub-elongatum, medio leviter constrictum, nitidum: capite fortiter nutante, basi pronoti multo angustiore, vertice sat angusto, immarginato, margine tenui, clypeo levissime prominente, basi depressa cum fronte confluente, genis humilibus: oculis orbita interiore apicem versus late sinuatis, postice retrorsum haud productis; antennis crassiusculis, articulo secundo versus apicem incrassato, ultimis secundo aeque crassis, ultimo elongato-fusiformi: pronoto leviter transverso, strictura apicali tenui depressa, lateribus fortiter sinuatis a medio basin versus valde ampliatis, ubique callis exceptis dense impresso-punctato, callis sat maginis laevibus antice confluentibus, margine basali truncato, utrinque ante angulos leviter sinuato, limbo basali hoc loco impresso: scutello basi fortiter declivi, parte apicali in processum crassum et altum, erectum, apice rotundatum, antice et postice com-

pressum, ab antico visum fere linguaeformem surgente; hemielytris medio dilatatis, fasciis angustis albis signatis, impresso-punctatis, corio apice incrassato et basi cunei altiore, cuneo horisontali; tibiis submuticis, sat crassis, anticis apicem versus sensim incrassatis, posticis nonnihil compressis: tarsis posticis articulo primo brevi, tertio duobus primis simul sumtis fere aeque longo.

Primo intuitu generi *Pilophorus* Hahn similis, structura capitis, antennarum, pronoti, scutelli et hemielytrorum puncturaque impressa mox distinguendus: a *Laurinia* Ferr. et Reut. structura pronoti divergens. Caput latitudine cum oculis aeque longum, infra oculos sat longe productum, vertice levissime, fronte fortiter declive, clypeo leviter prominulo, basi depressa cum fronte confluente, genis humilibus, loris bene discretis versus insertionem antennarum vergentibus, angulo faciali recto, gula brevi. Oculi sat prominentes, orbitis sinuatis, postice supra angulos pronoti haud incumbentes. Rostrum coxas posticas attingens, articulo primo basin capitis paullo superante. Antennae paullo supra apicem oculorum interne insertae, articulo primo apicem clypei paullo superante, ultimis duobus simul sumtis secundo brevioribus. Pronotum fortiter convexo-declive, impresso-punctatum, utrinque prope angulos basales impressum, margine basali medio truncato, utrinque ad impressionem late et breviter sinuato. Scutellum jam superne descriptum. Hemielytra cum membrana tota fortiter nitida. Xyphus prosterni triangularis, planus. Tibiae posticae subrectae. Ungviculi arcuati, basi leviter ampliati, aroliis tenuissimis vix distinguendis.

Glossopeltis Coutierei n. sp.

Tab. I, fig. 3.

Fuscus vel picescenti-cinnamomeus, basi et apice articuli primi basique articuli tertii antennarum, fasciis duabus angustis corii, cuneo basin versus, orificiis metastethii, coxis posterioribus, femoribus apice anguste, posterioribus etiam basi, tibiis apice magis minusve late, interdum etiam linea

inferiore basali, nec non basi tarsorum albidis; antennis articulo secundo apice duobusque ultimis nigro-fuscis. Long. ♀ 4 mm.

Obock! die 11 junii 1896, m. julii 1897, M. Jousseaume: Djibouti! 1897, M. H. Coutière (Mus. Paris.).

Corpus glabrum, nitidum. Caput basi pronoti duplo angustius, laeve, vertice (♀) oculo paullo latiore. Rostrum cinnamomeum. Antennae tenuiter griseo-pubescentes, articulo primo cinnamomeo, basi et apice albido, secundo pronoto vix longiore, obscure cinnamomeo, apice incrassato nigro-fusco, ultimis nigro-fuscis, tertio basi anguste albido, secundo paullo magis qvam $^3/_5$ breviore, quarto tertio circiter $^1/_5$ breviore. Pronotum latitudine basali circiter $^1/_6$ brevius, crebre sat fortiter impresso-punctatum. Scutellum laeve. Hemielytra cum membrana valde nitida, remote et minute impresso-punctata, sutura clavi utrinque serie impresso-punctata: corio fascia anteriore in tertia parte antica posita, posteriore a margine externo ad apicem clavi ducta.

15. Glaphyrocoris n. gen.

Corpus elongatum, angustum, medio leviter constrictum; capite basi pronoti paullulum angustiore, fortiter nutante, ab antico viso rotundato et infra oculos sat breviter producto, latitudini cum oculis aeque longo, vertice immarginato sed margine tenui acuto, clypeo brevi, sat prominente, ab antico viso lato, a fronte linea obtusangulata impressa discreto, angulo faciali acuto, genis humilibus, gula longa, obliqua; oculis (♂) magnis, granulatis, pronoto contiguis, orbita interiore apicem versus late sinuatis; rostro apicem coxarum attingente, articulo primo peristomii longitudine; antennis crassis, paullo supra apicem oculorum interne insertis, articulo primo apicem clypei attingente, secundo versus apicem leviter incrassato, ultimis apici secundi saltem aeque-crassis, simul sumtis secundo paullulum longioribus, quarto subfusiformi; pronoto parum transverso, fortiter convexo-declivi, laevi, versus apicem fortiter angustato, lateribus rectis, strictura apicali libera,

sat lata, callis haud discretis, margine basali latissime rotundato; scutello pronoto aeque alto, basi obtecto, parte apicali apicem versus fortiter declivi; hemielytris totis nitidis, laevibus, a medio leviter dilatatis, fractura cunei sat profunda; tibiis muticis, praecipue posticis compressis, anticis ubique aeque crassis, posticis ante medium leviter dilatatis; tarsis posticis articulo primo brevi, tertio duobus primis simul sumtis longitudine subaequali, ungviculis sat curvatis, basi breviter ampliatis, aroliis haud distinguendis.

Praecedenti structura antennarum sat similis, structura autem capitis praecipueque pronoti et scutelli mox distinctus: inter genera *Laemocoris* Reut. et *Allodapus* Fieb. locandus videtur, ab illo structura antennarum, vertice immarginato, hemielytris postice distincte ampliatis, pedibus brevioribus etc. divergens. Caput loris bene dircretis versus basin antennarum vergentibus; vertice levissime, fronte valde declivibus. Oculi orbita interiore in vertice basin versus rotundato-divergentes. Antennae articulo secundo latitudine media capitis (cum oculis) parum longiore. Abdomen basin versus leviter constrictum.

Glaphyrocoris unifasciatus n. sp.

Tab. I. fig. 4.

Cinnamomeo-piceus, glaber et laevis, nitidus, articulo primo antennarum, tibiis apicem versus tarsisque basi pallidis, flavo-testaceis, orificiis fasciaque tenui transversali per tertiam partem basalem hemielytrorum ducta albis. Long. ♂ 3 mm.

Djibouti!, D. H. Coutière 1897 (Mus. Paris.).

Caput basi pronoti parum magis qvam $^1/_6$ angustius, a latere visum paullo minus qvam duplo brevius, vertice (♂) medio oculo paullo latiore. Antennae articulo secundo pronoto longitudine subaequali, tertio secundo circiter $^3/_7$ breviore et apice hujus fere crassiore, quarto tertio paullo breviore. Pronotum basi qvam apice fere triplo latius. Hemielytra fascia alba in corio latiore, in clavo attenuata.

16. Aeolocoris n. gen.

Corpus oblongum, opacum, superne cum hemielytris dense albo- et fusco-conspersum: capite parvulo, verticali, ab antico viso pentagonali, leviter transverso, a latere viso altitudine parum breviore, vertice horizontali, immarginato, fronte basi levissime declivi, apicem versus subito verticali, clypeo prominente, verticali, basi leviter arcuato, apicem versus verticali, basi a fronte linea impressa bene discreta, ipsa basi paullo infra lineam intermediam oculorum posita, angulo faciali recto, genis sat humilibus (♀), gula brevi, horizontali: oculis haud divergentibus, setulis albis fragillimis ornatis, orbita interiore media late sinuatis rostro coxas posticas paullo superante, articulo primo medium xyphi prosterni sub-attingente, antennis longis, mox infra medium oculorum interne insertis, articulo primo incrassato, secundo longo, lineari, ultimis secundo aeque crassis; pronoto leviter transverso, apicem versus sat fortiter declivi, strictura apicali sat lata, callis magnis, sat convexis, medio sat late distantibus, lateribus sinuatis, margine basali lateribus rotundato, medio late sinuato: scutelli parte apicali disco convexa; hemielytris parallelis: femoribus elongatis, tibiis breviter spinulosis, tarsis posticis articulo primo brevi, ultimo duobus primis simul sumtis fere aeque longo, ungviculis sat leviter arcuatis, basi leviter ampliatis, aroliis tenuissimis, pilaeformibus.

Generi *Acrorrhinio* Noualh. affinis, structura capitis et antennarum mox distingvendus. Caput loris optime discretis. Oculi a supero visi globosi. Xyphus prosterni triangularis, planiusculus, marginibus leviter reflexis. Coxae anticae medium mesosterni longe superantes, posticae ab epipleuris hemielytrorum parum remotis. Terebra feminae medium ventris distincte superans.

Aeolocoris alboconspersus n. sp.


Tab. I, fig. 5.

Supérne grisescenti-fuscus, capite pronoto et scutello guttulis vel fere granulis parvis albis adspersis, hemielytris

densissime minute albo-conspersis; guttula majore elevata ad medium marginis basalis pronoti, scutello utrinque striola basali tenui curvata vittulaque apicali nec non clavo arcu vel macula communi media commissurae magis minusve determinata albis; hemielytris setulis albis rigidis facile divellendis instructis; membrana cum venis fusca vel fusco-nigra, vena connectente albida; inferne fusco-niger, coxis posterioribus albis; antennis pedibusque fusco-nigris, illis articulis duobus primis, femoribus saltem dimidio apicali tibiisque guttulis albis conspersis. Long. ♀ $4^3/_4$—5 mm.

Obock! d. 11 junii 1896, D. Jousseaume; Djibouti! 1897, D. H. Coutière; Arabia meridionalis (Aden!), D. Jousseaume (Mus. Paris.).

Caput basi pronoti circiter $^2/_5$ angustius, a supero visum pronoto, strictura apicali excepta, aeque longum, fuscum, granulis albis parcius adspersum, vertice (♀) oculo circiter $^1/_3$ latiore. Antennae (♀) articulo primo pronoto, strictura apicali excepta, aeque longo, strictura apicali pronoti fere dimidio crassiore, fusco vel fusco-griseo, magis minusve alboconsperso, breviter albo-setuloso, secundo margini laterali corii aeque longo, fusco, albo-guttulato, interdum apicem versus albicante, tertio fusco, secundo circiter $^3/_7$ breviore. Rostrum fuscum. Pronotum latitudine basali circiter $^1/_4$ brevius, apice qvam basi circiter duplo angustius, grisescens vel griseo-fuscum, guttulis albis adspersum, margine basali medio granulo prominulo albo instructo. Scutellum nigro-fuscum, pube subtilissime sericante flavescente facile divellenda, parce albo-guttulatum, basi utrinque striola tenui curvata apiceque albidis. Hemielytra abdomen paullulum superantia, griseofusca, densissime minute albo-conspersa, clavo plerumque macula communi media commissurae, etiam corio interdum macula media albicantibus, his interdum postice nigro-terminatis, cuneo apicem versus late nigro-fusco. Pedes nigro-fusci, femoribus, parte basali excepta, tibiisque albo-guttulosis, his breviter albo-spinulosis; tarsis totis nigro-fuscis.



O. M. Reuter del. Lith. G. Arvidsson